

ロタウイルスワクチンが定期接種になります！

予防接種法が改正され令和 2 年 10 月 1 日から施行されることに伴い、厚岸町でもロタウイルスワクチンを定期予防接種として接種できます。対象は、令和 2 年 8 月 1 日以降に生まれた方です。

【ロタウイルス胃腸炎とは？】

口から侵入したロタウイルスが腸管に感染して発症します。感染力が非常に強く、手洗いや消毒などをしっかりしても、感染予防をすることが難しいため、乳幼児のうちに、ほとんどの子どもが感染します。下痢や嘔吐は 1 週間程度で治りますが、下痢、嘔吐が激しくなると、脱水症状を起こす場合もあり、乳幼児の急性胃腸炎の入院の中で、もっとも多い感染症です。一生のうちに何度も感染するウイルスですが、初めてロタウイルスに感染した時は、特に重症化しやすく、まれに脳や腎臓に影響をおよぼすこともあり、注意が必要です。生後、すぐに感染する場合もあるので、ワクチンの接種は、早い時期に完了させます。

【ワクチンについて】

ロタウイルスワクチンは 2 種類あり、どちらも生ワクチンで、飲むワクチンです。

2 種類とも、**予防効果や安全性に差はありませんが、接種回数が異なります。**厚岸町内の医療機関ではロタリックスのみの取り扱いとなります。

(原則、途中からワクチンの種類を変更することはできませんので、最初に接種したワクチンを 2 回目以降も接種します。)

多くのワクチンの接種が重なる期間ですので、医療機関と相談して、他のワクチン接種と合わせて同時に接種することも検討してください。初回は、生後 2 か月から出生 14 週 6 日後までに接種します。出生 15 週 0 日後以降の初回接種は副反応のリスクが高まることからおすすめしません。

なお、このワクチンは、ロタウイルス胃腸炎の発症そのものを 7~8 割減らし、入院するような重症化は、そのほとんどが予防できます。ただし、ロタウイルス以外の原因による胃腸炎には予防効果を示しません。

ワクチン名	ロタリックス
接種時期	出生 6 週 0 日後から 24 週 0 日後まで (※初回接種は、生後 2 か月から出生 14 週 6 日後までにします。)
接種回数	2 回接種 (27 日以上の間隔をあける)
接種後、特に注意する事	接種後 (特に 1~2 週間) は腸重積症の症状に注意し、症状が見られた際には、すみやかに接種した医療機関を受診してください。

【ワクチンを接種する前】


赤ちゃんのお腹がいっぱいと、上手にワクチンが飲めない場合がありますので、**接種前 30 分ほどは授乳を控えることをおすすめ**ます。上手に飲めるよう、医師、看護師の指示に従ってください。なお、ワクチンがうまく飲めなかったり、吐いたりしてしまった場合でも、わずかでも飲み込みが確認できていれば、ワクチンの効果に問題ありませんので、再度接種する必要はありません。

[ワクチンを接種した後]

接種直後は、医療機関で30分ほど様子を見てから帰宅してください。ワクチン接種後2週間ほどは、赤ちゃんの便の中に、ワクチンのウイルスが含まれることがあります。おむつ交換の後など、ていねいに手を洗ってください。 高熱、けいれんなど、異常を感じた場合は、すぐに医師の診察を受けてください。

[腸重積症について]

腸重積症とは、腸が腸に入り込み、閉塞状態になることです(下図)。0歳児の場合、ロタウイルスワクチンを接種しなくても起こる病気で、もともと、3~4か月齢ぐらいから月齢が上がるにつれて多くなります(下のグラフ)。早めに接種を開始し、完了させることがすすめられています。



腸重積症は、手術が必要になることもありますが、発症後、早く治療すれば、ほとんどの場合、手術をせずに治療できます。以下のような症状が一つでも現れたら、腸重積症が疑われます。

- 泣いたり不機嫌になったりを繰り返す
- 嘔吐を繰り返す
- ぐったりして顔色が悪くなる
- 血便がでる

このような症状に気づいたら、すみやかに接種した医療機関を受診してください。

接種した医療機関とは別の医療機関を受診する場合は、このワクチンを接種したことを医師に伝えてください。

[接種できない場合]

明らかに発熱(通常37.5℃以上)している人や、重度の急性疾患にかかっている人、過去に同じワクチンで強いアレルギー反応が出た人は、接種することができません。また、未治療の先天的な消化管障害のある人や、過去に腸重積症をおこした人、重症複合型免疫不全(SCID)のある人も、接種できません。このほかにも、接種を中止したり、延期したりしたほうがよい場合もありますので、予防接種を受ける日には、あらかじめ予診票を記載して受診し、医師と相談してください。

[お問合せ先]

厚岸町保健福祉総合センターあみか21
保健福祉課健康推進係
0153-53-3333