

予防接種を受ける方へ

【厚岸町保健福祉課健康推進係 ☎0153-53-3333】

予防接種法に基づき、次の予防接種を行っています。
 予防接種の効果や副作用をよく理解したうえで接種を受けましょう。

種類	生・不活化ワクチン	対象者	標準的な接種期間
ロタウイルス (ロタリックス)	生ワクチン【経口】	出生6週0日後～24週0 日後まで ※R2.8.1以降に生まれた児	初回は生後2か月～出生14週6日後まで
小児用肺炎球菌	不活化ワクチン	生後2か月～5歳未満	【初回】生後2月～7か月未満 【追加】初回接種終了後、60日以上あけて 生後12か月～生後15か月まで
B型肝炎	不活化ワクチン	1歳未満(誕生日の前 日まで)	生後2か月～9か月未満 ※母子感染予防として接種履歴がある場合 は、対象外となります。
new 五種混合 (百日咳、ジフ テリア、破傷風、 ポリオ、Hib)	不活化ワクチン	生後2ヶ月～5歳未満	【1期初回】生後2か月～12か月未満 【1期追加】第1期初回接種(3回)終了後、1 年～1年半あける ※令和6年4月から開始となります ※4種混合ワクチン、Hibワクチンで接種を開始し た方は、4種混合ワクチン、Hibワクチンで接種を 完了させます
BCG	生ワクチン【注射】	1歳未満	生後5か月～8か月未満
麻しん・風 しん混合 (MR)	生ワクチン【注射】	【1期】 1歳～2歳未満 【2期】 小学校入学前の1年間	左に同じ
水痘(水ぼう そう)	生ワクチン【注射】	1歳～3歳未満	【1回目】生後12か月～15か月まで 【2回目】1回目終了後、6か月～12か月あける
日本脳炎 ※生年月日によ って接種方法 が異なる場合 があります。	不活化ワクチン	【1期初回・1期追加】 生後6か月～7歳6か月未 満 【2期】 9歳～13歳まで	【1期初回】 3歳～4歳未満 【1期追加】 4歳～5歳未満 【2期】 9歳～10歳未満
二種混合 (ジフテリア、破 傷風)	不活化ワクチン	11歳～13歳未満	11歳～12歳未満
ヒトパピロー マウイルス 感染症	不活化ワクチン	小学校6年生～高校1年 生相当年齢の女子 ※令和7年3月末まで特例 あり、対象者には個別に案内 しています	中学1年生の間

予防接種を受ける前の注意事項

【厚岸町保健福祉課健康推進係 ☎0153-53-3333】

予防接種を受ける前のチェック項目

- ☐ お子さんの体調はよいですか。
- ☐ 受ける予防接種について、必要性や効果及び副反応など理解していますか。
- ☐ 『母子健康手帳』は持っていますか。
- ☐ 町から手渡し、個別送付されている接種券を持っていますか。
- ☐ 予診票の記入は済みましたか。
- ☐ 保護者の方が同伴できない場合には、代理人の方に委任状を渡しましたか。

次のような方は予防接種を受けられません

- 【1】明らかに発熱（通常37.5℃以上をいいます。）しているお子さん
- 【2】重とくな急性疾患にかかっていることが明らかなお子さん
- 【3】その日に受ける予防接種の接種液に含まれる成分で、アナフィラキシーを起こしたことのあるお子さん
（※『アナフィラキシー』とは通常接種後30分以内に起こるひどいアレルギー反応のことです）
- 【4】その他、医師が不適当な状態と判断した人

次のような方は予防接種を受ける前にお医者さんとはよく相談してください

- 【1】心臓病、腎臓病、肝臓病、血液の病気や発達障がいなどで治療を受けているお子さん
- 【2】予防接種で、接種後2日以内に発熱の見られたお子さん及び発疹、じんましんなどのアレルギー症状と思われる異常が見られたお子さん
- 【3】過去にけいれん（ひきつけ）を起こしたことがあるお子さん
- 【4】過去に免疫不全の診断がなされているお子さんや近親者に先天性免疫不全症の方が居るお子さん
- 【5】ワクチンにはその製造過程における培養に使う卵の成分、抗生物質、安定剤などが入っている物があるので、これらにアレルギーがあるとされたお子さん

予防接種を受けた後の注意事項

- 【1】接種を受けた後30分程度は、接種した医療機関でお子さんの様子を観察するか、医師とすぐ連絡を取れるようにしましょう。急な副反応が、この間に起こることがまれにあります。
- 【2】接種後、生ワクチンでは4週間、不活化ワクチンでは1週間は副反応の出現に注意しましょう。
- 【3】接種部位は清潔に保ちましょう。入浴は差し支えありませんが、接種部位をこすことはやめましょう。
- 【4】接種当日は、はげしい運動は避けましょう。
- 【5】接種後、接種部位の異常な反応や体調の変化があった場合は、速やかに医師の診察を受けましょう。
- 【6】異なるワクチンの予防接種を受けるまでに必要な間隔は以下の通りです。

※令和2年10月に接種間隔が改定されました。

異なるワクチンの接種間隔パターン

※以下のパターンは、あくまでも異なるワクチンを接種する場合の接種間隔です。
同一ワクチンの接種間隔は、各ワクチンごとに定められた間隔に従ってください。

